MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Académie :
Département :

SP²A
Société pédiatrique de pneumologie & allergologie

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 02

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels (*autres que le 15 ou le 112*) :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Enfant allergique à :

Consommation autorisée des produits portant les mentions d'étiquetage de précaution (« peut contenir des traces de … », « a été fabriqué dans un atelier pouvant… ») ? ◉ oui ◯ non

- **Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**
- **Rester avec l'élève**
- **Évaluer la situation** (la réaction a eu lieu dans les minutes suivant l'exposition) **et la gravité**

La réaction est GRAVE

Si **1 seul** des signes parmi les suivants

- **Il respire mal et sa voix change**
- **Il respire mal et il siffle ou il tousse**
- **Il a très mal au ventre, il vomit plusieurs fois**
- **Il devient rapidement rouge sur tout le corps et ses mains, ses pieds, son cuir chevelu le démangent**
- **Il se sent mal ou bizarre**
- **Il fait un malaise**

1. **Allonger l'enfant ou le laisser ½ assis en cas de gêne pour respirer**
2. **Injecter L'ADRENALINE dans la face externe de la cuisse**
   Spécialité :
3. **Appeler le SAMU (15 ou 112)**
4. **Si gêne respiratoire :** faire inhaler bouffées de avec la chambre d'inhalation
   (5 respirations après chaque bouffée à répéter si persistance de la gêne après 15 minutes).

   En attendant les secours, une 2ème injection d'adrénaline peut être faite si les symptômes persistent après 5 à 10 minutes
5. **Informer la famille**

La réaction est MODEREE

- Sa bouche pique, ses lèvres gonflent
- Ses yeux piquent, son nez coule
- Des plaques rouges démangent de façon localisée
- Il a un peu mal au ventre et/ou il a envie de vomir
- Autre :

Mais il parle bien et il respire bien

1. Traitement anti-histaminique par voie orale :
2. Surveiller l'enfant jusque disparition complète des symptômes
3. Prévenir les parents et leur conseiller de consulter un médecin
4. Autre :

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION
ou si apparition d'un nouveau signe, évaluer de nouveau la gravité de la réaction **POUR NE PAS RETARDER L'INJECTION D'ADRENALINE**

☐ **Existence d'une fiche de liaison confidentielle pour le médecin EN**

☐ **Existence d'un courrier sous pli pour les secouristes**

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT

Annexe : Modalités de l'injection de l'adrénaline selon la présentation du produit

ANAPEN

Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille.

Retirer le bouchon protecteur.

Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse.

Appuyer sur le bouton rouge et maintenir appuyé 10 sec. Puis masser la zone d'injection.

EMERADE

Enlever le bouchon blanc.

Placer le stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit

Appuyer fermement et maintenir appuyé pendant 5 secondes

Puis masser la zone d'injection

EPIPEN

Enlever
Le capuchon bleu

Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit

Enfoncer fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes



Puis masser la zone d'injection

JEXT

Enlever
le bouchon jaune.



Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit

Appuyer fermement sur la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes.



Puis masser la zone d'injection.

Nom/ Prénom :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT